ЛП-№(015312)-(РГ-RU) от 16.06.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 02.06.2026 № 10909
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Листок-вкладыш – информация для пациента

ВИФЕРОН, 36 000 МЕ/г, гель для наружного и местного применения

Действующее вещество: интерферон альфа-2b

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на неперечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если Ваше состояние или состояние Вашего ребенка не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат ВИФЕРОН, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед применением препарата ВИФЕРОН.

3. Применение препарата ВИФЕРОН.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата ВИФЕРОН.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат ВИФЕРОН, и для чего его применяют

Препарат ВИФЕРОН содержит действующее вещество интерферон альфа-2b, которое относится к фармакотерапевтической группе «иммуностимуляторы; интерфероны».

Интерферон альфа-2b обладает выраженными противовирусными, противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами.

Показания к применению

Препарат ВИФЕРОН показан к применению:

- в составе комплексной терапии острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), включая грипп, частых и длительных ОРВИ, в том числе осложненных бактериальной инфекцией, у взрослых и детей;
- для профилактики острых респираторных вирусных инфекций, включая грипп, у взрослых и детей;
- в составе комплексной терапии рецидивирующего стенозирующего ларинготрахеобронхита у детей;
- для профилактики рецидивирующего стенозирующего ларинготрахеобронхита у детей;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 02.06.2026 № 10909
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

- в составе комплексной терапии острой и обострений хронической рецидивирующей герпетической инфекции кожи и слизистых оболочек, в том числе урогенитальной формы герпетической инфекции у взрослых;
- в составе комплексной терапии герпетического цервицита у взрослых женщин.

Если улучшение не наступило или Вы или Ваш ребенок чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата ВИФЕРОН

Противопоказания

Не применяйте препарат ВИФЕРОН:

- если у Вас аллергия на действующее вещество или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата ВИФЕРОН проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Другие препараты и препарат ВИФЕРОН

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы или Ваш ребенок применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность и период грудного вскармливания не являются противопоказанием для применения препарата в силу очень низкой абсорбции препарата. В период грудного вскармливания не применять на область сосков и ареолы.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

При применении в рекомендуемых дозах препарат не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат ВИФЕРОН содержит бензойную кислоту (Е210) и этанол

Данный лекарственный препарат содержит 0,0005 г бензойной кислоты (Е210) в каждом грамме геля, может вызывать местное раздражение и усиливать желтуху (пожелтение кожи и глаз) у новорожденных (в возрасте до 4 недель).

Данный лекарственный препарат содержит 0,055 г этанола в каждом грамме геля, может вызывать чувство жжения на поврежденной коже.

3. Применение препарата ВИФЕРОН

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), включая грипп, частые и длительные ОРВИ, в том числе осложненные бактериальной инфекцией, у взрослых и детей (в составе комплексной терапии): полоску геля длиной не более 0,5 см наносят на предварительно подсушенную поверхность слизистой оболочки носа и/или на поверхность небных миндалин

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 02.06.2026 № 10909
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

3–5 раз в день при помощи шпателя или ватного тампона/ватной палочки. Курс лечения составляет 5 дней, при необходимости курс может быть продлен.

Профилактика острых респираторных вирусных инфекций, включая грипп, у взрослых и детей: в период подъема заболеваемости полоску геля длиной не более 0,5 см наносят на предварительно подсушенную поверхность слизистой оболочки носа и/или на поверхность небных миндалин 2 раза в день в течение 2–4 недель.

Острая и хроническая рецидивирующая герпетическая инфекция кожи и слизистых оболочек, в том числе урогенитальная форма герпетической инфекции, у взрослых (в составе комплексной терапии): полоску геля длиной не более 0,5 см наносят при помощи шпателя или ватного тампона/ватной палочки на предварительно подсушенную пораженную поверхность 3–5 раз в день в течение 5–6 дней, при необходимости продолжительность курса увеличивают до исчезновения клинических проявлений. Желательно начинать терапию при появлении первых признаков заболевания или в период предвестников.

Герпетический цервицит у взрослых женщин (в составе комплексной терапии): 1 мл геля наносят ватным тампоном на предварительно очищенную от слизи поверхность шейки матки 2 раза в день в течение 7 дней, при необходимости продолжительность курса может быть увеличена до 14 дней.

Применение у детей и подростков

Для терапии и профилактики острых респираторных вирусных инфекций, включая грипп, режим дозирования для детей не отличается от режима дозирования для взрослых.

Рецидивирующий стенозирующий ларинготрахеобронхит у детей (в составе комплексной терапии): полоску геля длиной не более 0,5 см наносят на поверхность небных миндалин при помощи шпателя или ватного тампона/ватной палочки в остром периоде заболевания 5 раз в день, в течение 5–7 дней, затем 3 раза в день в течение последующих 3 недель.

Профилактика рецидивирующего стенозирующего ларинготрахеобронхита у детей: полоску геля длиной не более 0,5 см наносят на поверхность небных миндалин при помощи шпателя или ватного тампона/ватной палочки 2 раза в день в течение 3–4 недель, курсы повторяют 2 раза в год.

По показаниям «в составе комплексной терапии острой и обострений хронической рецидивирующей герпетической инфекции кожи и слизистых оболочек, в том числе урогенитальной формы герпетической инфекции у взрослых» и «в составе комплексной терапии герпетического цервицита у взрослых женщин» ВИФЕРОН у детей в возрасте от 0 до 18 лет не применяется.

Путь и (или) способ введения

Препарат применяют наружно на поверхность кожи и местно на слизистые оболочки.

На слизистую оболочку носовой полости гель наносят после очищения носовых проходов, на поверхность небных миндалин – через 30 мин после принятия пищи. При нанесении геля на небные миндалины не прикасаться к миндалинам ватным тампоном, а лишь гелем, гель при этом самостоятельно стекает вниз по поверхности миндалины. При нанесении геля на шейку матки следует предварительно удалить ватным или марлевым тампоном слизь и выделения со сводов влагалища и шейки матки.

После нанесении геля на пораженные участки кожи и слизистые оболочки через 30–40 мин образуется тонкая пленка, на которую возможно повторное нанесение препарата. При желании, пленку можно отслоить или смыть водой перед очередным нанесением.

Если Вы или Ваш ребенок применили препарат ВИФЕРОН больше, чем следовало

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 02.06.2026 № 10909
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Если Вы или Ваш ребенок применили препарат ВИФЕРОН больше, чем следовало, приостановите применение препарата и немедленно сообщите об этом врачу, даже если Ваше состояние или состояние Вашего ребенка не вызывает опасений.

Если Вы или Ваш ребенок забыли применить препарат ВИФЕРОН

Если Вы или Ваш ребенок забыли применить препарат ВИФЕРОН примените его, как только Вы об этом вспомните. Если Вы об этом не вспомнили до времени применения Вашей следующей дозы, не применяйте пропущенную дозу и вернитесь к Вашему обычному графику применения. Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат ВИФЕРОН может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

В редких случаях возможно развитие аллергических реакций (кожные высыпания, зуд).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас или у Вашего ребенка возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на неперечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях непосредственно через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств-членов Евразийского экономического союза, контакты которых указаны ниже. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://www.roszdravnadzor.gov.ru

Республика Казахстан

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Адрес: 010000, г. Астана, район Байконыр, ул. А. Иманова, д. 13 (БЦ «Нурсаулет 2»)

Телефон: +7 (7172) 235-135

Электронная почта: pdlc@dari.kz

Сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://www.ndda.kz

Кыргызская Республика

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 02.06.2026 № 10909
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Адрес: 720044, г. Бишкек, ул. 3-я линия, 25

Телефон: 0 800 800 26 26

Факс: +996 312 21 05 08

Электронная почта: pharm@dlsmi.kg

Сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://www.dlsmi.kg

5. Хранение препарата ВИФЕРОН

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на тубе алюминиевой или пачке из картона.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить в холодильнике (2–8 °С).

После вскрытия тубы хранить в холодильнике (2–8 °С) не более 2 месяцев.

Не пригоден к применению препарат с нарушенной целостностью упаковки и изменившимся цветом.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат ВИФЕРОН содержит

Действующим веществом является интерферон альфа-2b.

Каждый грамм геля содержит 36 000 МЕ интерферона альфа-2b.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: альфа-токоферола ацетат, метионин, бензойная кислота (Е210), лимонной кислоты моногидрат, натрия тетраборат декагидрат, натрия хлорид, альбумин человека, глицерол, кармеллоза натрия, сополимер гидроксиэтилакрилата/ акрилоилдиметилтаурата натрия, этанол, вода очищенная.

Препарат ВИФЕРОН содержит бензойную кислоту и этанол (см. раздел 2).

Внешний вид препарата ВИФЕРОН и содержимое упаковки

Гель для наружного и местного применения.

Непрозрачная гелеобразная масса белого цвета с сероватым оттенком.

По 12 г в тубе алюминиевой. 1 туба с листком-вкладышем в пачке из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

ООО «ФЕРОН»

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73 эт. 6 п. 1 к. 46 оф. 602

Телефон: +7 (495) 646-12-19

Электронная почта: info@viferon.su

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 02.06.2026 № 10909
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Производитель

Российская Федерация

ООО «ФЕРОН»

141734, Московская обл., городской округ Лобня, г. Лобня, шоссе Краснополянское, д. 10

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация и Кыргызская Республика

ООО «ФЕРОН»

125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, БЦ «Аэродом»

Телефон: +7 (495) 646-12-19

Электронная почта: info@viferon.su

Республика Казахстан

ИП «ABC Pharma»

050009, г. Алматы, ул. Гагарина 8/24

Телефон: +7 (777) 368-85-82; +7 (701) 670-07-85

Электронная почта: mail@abcpharma.kz

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://grls.rosminzdrav.ru/ (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).